
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ — ЧАСТЬ 9 ИЗ 10

Механизм → показания → дозы → ограничения. Метоклопрамид (Церулин) · Вальпроевая кислота · Пиридоксин (B6)


1. ЖКТ: КИСЛОТНОСТЬ И МОТОРИКА



Метоклопрамид (Церулин)


- Механизм: блокада D2 (триггерная зона) и 5-HT3 + агонизм 5-HT4: противорвотное, ↑моторика верхних отделов ЖКТ.
- Показания: тошнота/рвота (в т.ч. мигрень, послеоперационная, лучевая), гастропарез, ГЭРБ.
- Дозы: 10 мг в/в медленно (≥3 мин) или в/м до 3 р/сут, интервал ≥6 ч (макс 30 мг/сут или 0,5 мг/кг/сут); внутрь 10 мг × 3–4/сут (макс 60 мг/сут).
- Осторожно: дистония/ЭПС (чаще у лиц <30 лет), поздняя дискинезия, удлинение QT, гиперпролактинемия; противопоказан при эпилепсии, паркинсонизме, феохромоцитоме, кишечной непроходимости; антидот дистонии — дифенгидрамин/бипериден.

2. НЕВРОЛОГИЯ И МЕТАБОЛИЗМ



Вальпроевая кислота

- Механизм: блокада Na+-каналов + ↑ГАМК (ингибирование ГАМК-трансаминазы): антиконвульсант, нормотимик.
- Показания: генерализованные и фокальные эпилепсии, эпилептический статус (в/в), биполярное расстройство, профилактика мигрени.
- Дозы: внутрь старт 10–15 мг/кг/сут, ↑5–10 мг/кг/нед до 20–30 (макс 60) мг/кг/сут; статус — 15–40 мг/кг в/в за 5–10 мин (макс 3000 мг), затем 1–3 мг/кг/ч; скорость ≤6 мг/кг/мин; целевая концентрация 50–100 мкг/мл.
- Осторожно: гепатотоксичность (дети <2 лет, POLG-мутации), панкреатит, тромбоцитопения, гипераммонемия; тератогенен (дефекты нервной трубки, ↓IQ) — избегать у женщин детородного возраста.



Пиридоксин (B6)

- Механизм: кофермент (пиридоксаль-5-фосфат): обмен аминокислот, синтез ГАМК, серотонина, гема.
- Показания: гиповитаминоз B6, нейропатии (в т.ч. изониазид-индуцированные), пиридоксин-зависимые судороги, отравление изониазидом.
- Дозы: 50–100 мг в/м/в/в 1–2 р/сут (курс 3–4 нед); при отравлении изониазидом — 1 г на 1 г изониазида в/в (неизвестно — 5 г), скорость ≤0,5 г/мин, повтор до контроля судорог.
- Осторожно: длительно >200 мг/сут — сенсорная нейропатия; фотосенсибилизация; осторожно при тяжёлых поражениях печени (>50 мг/сут).